

AVERTISSEMENTS AGRICOLES**LORRAINE****GRANDES CULTURES**

Bulletin n° 2 du 7 février 1992

COLZA :

- SORTEZ VOS CUVETTES JAUNES.
- CHARANÇON DE LA TIGE :
- ATTENTION DES LES PREMIERS RECHAUFFEMENTS.

CEREALES : DESHERBAGE PRECOCE.**COLZA****Charançon de la tige :**


Cet insecte apparaît dès le retour du beau temps. Il peut occasionner d'importantes pertes de rendement en faisant éclater des tiges.

Dès **maintenant**, placez les cuvettes jaunes dans vos parcelles de colza, le fond de la cuvette au sommet de la végétation.

Dès que les facteurs suivants sont réunis durant 3 jours, le vol du charançon de la tige peut débuter :

- Températures maximales > ou = à 10°C
- Absence de précipitations
- Durée d'ensoleillement de 3 heures

Ce modèle a été vérifié depuis 3 ans au Service de la Protection des Végétaux de NANCY.



Intervenir 8 à 10 jours après les premières captures.

Traiter de préférence avec une pyréthrianoïde (à rémanence plus longue qu'un parathion).

7293

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



ABONNEMENT ANNUEL 260 F

CEREALES

Désherbage précoce de sortie d'hiver :

Il vise essentiellement les graminées et plus particulièrement le vulpin non (ou mal) contrôlé à l'automne.

Cette application avec isoproturon doit être faite sur **jeunes vulpins avant le stade tallage** à des doses modulables (1 000 g à 1 800 g/ha) en fonction :

- du stade du vulpin
- du nombre de vulpin/m²
- de la quantité d'argile dans le sol
- de la dose d'isoproturon apportée à l'automne.

Pour que le traitement soit efficace et sans danger :

- les céréales doivent être en bon état végétatif (absence de dégâts de gel ou de brûlure d'azote),
- les écarts de températures entre le jour et la nuit doivent être modérés sans risque de gel nocturne,
- l'intervention se fera avec un pulvérisateur bien réglé, des doses respectées, sur une végétation sèche,...

Si le vulpin est au stade tallage, **dans vos blés**, préférer un produit à base de fénoxaprop-éthyl (PUMA).

Suivez les Avertissements Agricoles ...



**... parce qu'un agriculteur
averti
en vaut deux.**

